

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ABONNEMENT ANNUEL

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 40-00-74)
(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MAYENNE, MORBIHAN, ORNE)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Route de Fougères - RENNES, (face à l'Hippodrome)
C. C. P. : RENNES 9.404-94

15 F.

Supplément n° 1 au bulletin n° 57

11 JUIN 1965

AVERTISSEMENTS

POMMES DE TERRE

MILDIOU - Avis valable pour le Finistère, la zone littorale des Côtes du-Nord, le Morbihan et la Plaine de Caen.

Dans les cultures de semence et de consommation ayant subi des pluies persistantes les premiers jours de cette semaine, effectuer un traitement dès le 14 ou 15.

Pour les autres cultures, attendre un nouvel avis.

Rappel : Pour qu'un traitement contre le Mildiou soit efficace, il est indispensable que la bouillie fongicide soit répartie de façon régulière sur l'ensemble des fanes, y compris la face inférieure des feuilles.

Ce résultat est obtenu avec les pulvérisateurs pneumatiques, ainsi qu'avec les appareils classiques, à condition que la rampe soit équipée de "pendillards".

* * *

CONCOURS MILDIOU - Le concours pour le dépistage des premières taches de Mildiou en plein champ reste ouvert. Nous demandons aux personnes qui en découvriraient de nous adresser immédiatement les feuilles atteintes. Se conformer au règlement du concours (voir fiche annexée à l'avis du 16 Avril)

INFORMATIONS

OIGNONS

MOUCHE DE L'OIGNON)

MILDIOU)

du 15 au 17, renouveler le traitement préconisé dans l'avis du 26 Mai.

C A R O T T E S

MOUCHE - Les vols se poursuivent et des pontes sont toujours à craindre.

Dans les situations où cet insecte cause habituellement des dégâts, effectuer un nouveau traitement, du 15 au 17, avec des produits à base de Diéthion ou Diazinon.

La pulvérisation doit être abondante et réalisée en deux temps :

- d'abord très près du sol, le jet dirigé sur le collet (le plus important)
- ensuite, pulvérisation plus haute, enveloppant les feuilles.

Ces insecticides sont efficaces contre les pucerons et les psylles.

H A R I C O T S

ANTHRACNOSE - Trois traitements sont généralement nécessaires pour limiter les dégâts dus à cette maladie. Le plus important doit être réalisé lorsque la plante a développé ses deux premières feuilles. La deuxième application doit se faire au stade "bouton floral" et la troisième à la formation des gousses.

Choisir l'un des produits suivants : Manèbe, Zinèbe, Thirame, Phaltane ...

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles

F. BARBOTIN et F. PAITIER

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux

J. DELOUSTAL.